









Critères de connaissance des végétaux de haie du lycée horticoles de Blois


Genres, espèces et cultivars des végétaux	Intérêt du végétal : exemple feuillage persistant, floraison, fructification, plantes mellifères. Attrait des auxiliaires etc.	Conduite de culture : Exigences culturales : exemple : besoins climatiques : Rusticité, irrigation, exigences sol.	Justification du positionnement proposé dans les 2 haies (8 et 16 végétaux). Exemple : voir ci-dessous pour le Buddleja.
1 /buddleja 'flutterby pink' (stérile)	Floraison estivale qui attire de nombreux insectes butineurs. La stérilité du végétal empêche sa multiplication car c'est une plante invasive dans sa forme spontanée.	Végétal sans exigences particulières résiste aux conditions excessives notamment climatiques (sécheresse et excès d'humidité). Tous types de sol même calcaire.	Feuillage caduc, floraison estivale rose. <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en avril-mai = Potentilla fruticosa 'Goldfinger' ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en mai-juin = Deutzia gracilis X Hybrida 'Perle Rose' <u>Haie de 8</u> :
2/Carpinus betulus	Feuillage marcescent, châtons jaunes et verts en mars-avril, fruits à coques décoratifs.	Il supporte le gel. L'idéal est une terre argilo-calcaire, souple, limoneuse, qui ne se désèche pas en surface, car l'enracinement est assez superficiel. Ses besoins en eau sont moyens.	Feuillage marcescent, qui fait des châtons jaunes et verts en mars-avril <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à feuillage persistant qui fleurit en mai = Ilex meserveae 'Hecken Blue' ; et d'un arbuste à feuillage semi-persistant qui fleurit de décembre à mars = Lonicera frangrantissima
3/Callicarpa dichotoma 'Albibacca' (Fruits décoratifs)	Feuillage caduc décoratif en automne. Fleurs roses pâles aux étamines jaunes en juin-juillet. Baies	Rustique : -25°C. Il demande peu d'entretien. Sol ordinaire, bien ameubli, même légèrement calcaire, acide à neutre, mais profond et restant frais	Feuillage caduc décoratif en automne, fleurs roses pâles en juin-juillet. <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à feuillage semi-persistant qui fleurit de

	blanches en grappes en septembre-octobre persistant souvent jusqu'au cœur de l'hiver, faisant le bonheur de certains oiseaux.	en été. Arrosages faibles.	décembre à mars = Lonicera fragrantissima ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit de décembre à mars = Chimonanthus praecox
4/Chimonanthus praecox	Feuillage caduc. Produit de décembre à mars des fleurs pendantes, parfumées. Le fruit est en forme de gourde. C'est une plante comestible mais ses graines sont toxiques.	Rustique : -15°C. Exige un drainage de qualité, il faut l'abriter des vents froids et des gelées tardives. Sol frais, riche, pH neutre, pas trop humide ni trop sec.	Feuillage caduc, floraison jaune de décembre à mars. <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en juin-juillet = Callicarpa dichotoma 'Albibacca' ; et d'un arbuste à feuillage persistant qui fleurit en avril-mai = Photinia X fraseri 'Magical Volcano'
5/Cornus kousa 'Big Apple' 	Feuillage caduc qui devient rouge vif à l'automne. Floraison en mai-juin, ce sont des bractées blanches. Elles ont une forme étoilée et tiennent plus d'un mois sur l'arbuste. Produit des fruits rouges sucrés à l'automne.	Rustique : -15°C. Préfère un sol plutôt acide et humifère. Besoins en eau réguliers.	Feuillage caduc qui devient rouge vif à l'automne, floraison blanche en mai-juin <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à feuillage persistant qui fleurit en avril-mai = Photinia X fraseri 'Magical Volcano' ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en avril-mai = Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
6/Cornus mas 'Jolico'  	Feuillage caduc. Les fleurs sont petites, jaunes, en bouquets, parfumées en	Rustique : -15°C. Sol drainé à léger, frais, riche et fertile, même calcaire, pH neutre, humifère. Besoins en eau	Feuillage caduc, qui fleurit jaune en février-mars <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à

	février-mars. Plante mellifère qui attire les abeilles. Produit des fruits rouges comestibles en septembre.	réguliers.	feuillage persistant, floraison blanche en mai-juin = Ligustrum japonicum 'Texanum' ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit rouge en mai-juin = Weigela 'Red Prince' <u>Haie de 8 :</u>
7/Deutzia gracilis X Hybrida 'Perle Rose' 	Feuillage caduc. Floraison parfumée en panicules roses-mauves bordées de blanc en mai-juin. Lante mellifère.	Rustique : -15°C. Il se contente d'un sol ordinaire, drainé, pH neutre, même calcaire et ponctuellement sec. Il redoute les sols compacts et gorgés d'eau en hiver.	Feuillage caduc, floraison en panicules roses-mauves bordées de blanc en mai-juin. <u>Haie de 16 :</u> placement entre un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en été = Buddleja 'flutterby pink' ; et d'un arbuste à feuillage persistant qui fleurit de novembre à avril = Viburnum tinus 'Château'
8/Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'	Feuillage caduc. Fleurs blanches en juillet-août. Fruit en capsule.	Rustique : -15°C. Craint la sécheresse. Aime les sols ayant une bonne capacité de rétention en eau. Sol frais, riche, drainé, pH acide ou neutre.	Feuillage caduc, floraison blanche en juillet-août. <u>Haie de 16 :</u> placement entre un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en mai-juin = Weigela 'Red Prince' ; et d'un arbuste à feuillage persistant qui fleurit en mai = Ilex meserveae 'Hecken Blue' <u>Haie de 8 :</u>
9/Ilex meserveae 'Hecken Blue'	Feuillage persistant, pourpre aux extrémités. Feuilles épineuses. Fleurs blanches-rosées en forme	Rustique : -15°C. Sol pas trop sec à frais, neutre ou acide, ordinaire, léger. Besoins en eau réguliers.	Feuillage persistant, floraison blanches-rosées en mai. <u>Haie de 16 :</u> placement entre un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en juillet-août =

	<p>d'ombrelles en mai. La proximité d'un sujet mâle de la même espèce favorisera la fructification des sujets femelles car elles produisent des baies rouges ou noires persistant l'hiver. Les frutis sont produits de septembre à mars. Ils sont décoratifs mais toxiques.</p>		<p>Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' ; et d'un arbuste à feuillage marcescent qui fleurit en mars-avril = Carpinus betulus <u>Haie de 8 :</u></p>
<p>10/Ligustrum japonicum 'Texanum' </p>	<p>Feuillage persistant/ fleurs blanches, très parfumées, en grappes en mai-juin. Les gibiers mangent les baies, mais elles sont toxique pour l'homme. Plante mellifère.</p>	<p>Rustique de -7°C à -15°C sur courte période. Sol pas trop sec à frais, terre argileuse ou pierreuse, bien drainé, même calcaire, de préférence pH 6-7.</p>	<p>Feuillage persistant, floraison blanche en mai-juin. <u>Haie de 16 :</u> placement à côté d'un arbuste à feuillage caduc, qui fleurit jaune en février-mars = Cornus mas 'Jolico' <u>Haie de 8 :</u></p>
<p>11/Lonicera fragrantissima </p>	<p>Feuillage semi-persistant. Fleurs blanches-jaunâtres, parfumées de décembre à mars. Plante mellifère très intéressante pour les abeilles à cette période de l'année où les fleurs rares. Baies rouges ternes appréciées par les oiseaux.</p>	<p>Rustique : -25°C. Sol bien drainé, profond, frais, limoneux, pH neutre. Arroser régulièrement les premières années.</p>	<p>Feuillage semi-persistant, floraison blanche de décembre à mars. <u>Haie de 16 :</u> placement à côté d'un arbuste à feuillage marcescent qui fleurit en mars-avril = Carpinus betulus ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en juin-juillet = Callicarpa dichotoma 'Albibacca' <u>Haie de 8 :</u></p>

<p>12/ Photinia X fraseri 'Magical Volcano'</p>	<p>Feuillage persistant. Feuilles rouges et vertes finement dentées. Garde son feuillage rouge toute l'année. Fleurs blanches, parfumées en avril-mai.</p>	<p>Rustique : -15°C. Sol riche, ordinaire, acide. Arrosage régulièrement la première année.</p>	<p>Feuillage persistant, floraison blanche en avril-mai. <u>Haie de 16</u> : placement à côté d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit de décembre à mars = Chimonanthus praecox ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en mai-juin = Cornus kousa 'Big Apple'</p>
<p>13/Potentilla fruticosa 'Goldfinger' </p>	<p>Feuillage caduc. Fleurs blanches de juin à octobre. Plante mellifère qui attire beaucoup les papillons. Les fruits sont des akènes.</p>	<p>Rustique : -15°C. Terre ordinaire, plutôt pauvre et bien drainée, pH neutre. Supporte la sécheresse, ses besoins en eau sont faibles.</p>	<p>Feuillage caduc, floraison blanche de juin à octobre. <u>Haie de 16</u> : placement à côté d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en mai-juin = Cornus kousa 'Big Apple' ; et d'un arbuste à feuillage caduc qui fleurit en été = Buddleja 'flutterby pink' <u>Haie de 8</u> :</p>
<p>14/Viburnum tinus 'Château' </p>	<p>Feuillage persistant. Les fleurs sont petites, blanches-rosées, parfumées, formant des bouquets l'extrémité des tiges. Elles fleurissent de novembre à avril. plante mellifère. Baies rondes de couleur bleu-noir réunies grappes très appréciées par les oiseaux.</p>	<p>Rustique : -10°C. Il doit être protégé des vents froids et secs. Sol ordinaire, frais, drainé, riche, fertile. Besoin d'arrosages réguliers.</p>	<p>Feuillage persistant, floraison blanche-rosée de novembre à avril. <u>Haie de 16</u> : placement à côté de deux arbustes à feuillage caduc qui fleurissent en mai-juin = Deutzia gracilis X Hybrida 'Perle Rose' ; et Lycium barbarum</p>

<p>15/Weigela 'Red Prince' </p>	<p>Feuillage caduc. Fleurs de couleur rouge foncé, en clochettes réunies en bouquets en mai-juin. Fruits en capsules contenant de nombreuses graines. Plantes mellifère.</p>	<p>Rustique : -15°C. Besoins d'arrosages réguliers pendant l'été. Sol frais, ordinaire, drainé, riche, pH neutre. besoins en eau moyens.</p>	<p>Feuillage caduc, floraison rouge en mai-juin <u>Haie de 16</u> : placement entre un arbuste à feuillage caduc, qui fleurit jaune en février-mars = Cornus mas 'Jolico' ; et d'un arbuste à feuillage caduc, qui fleurit en juillet-août = Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' <u>Haie de 8</u> :</p>
<p>16 / Lycium barbarum</p>	<p>Feuillage caduc. Fleurs violettes, en bouquets en mai-juin. Baies rouges ovoïdes en mai-juin et septembre-octobre.</p>	<p>Rustique : -20°C. Sol sec, riche ou peu fertile, drainé, neutre voire calcaire. Arrosage suivi pendant les deux premières années. Arroser régulièrement en période estivale.</p>	<p>Feuillage caduc, floraison violette en mai-juin. <u>Haie de 16</u> : ; placement entre un arbuste à feuillage persistant qui fleurit de novembre à avril = Viburnum tinus 'Château'</p>
<p>17/ Hydrangea paniculata 'Mont Blanc'</p>	<p>Feuillage caduc. Fleurs blanches en panicules, entre juillet et octobre.</p>	<p>Rustique : -25°C. Sol frais, acide, humide. Arroser régulièrement la première année de plantation, puis par période de forte chaleur les années suivantes.</p>	
<p>18/ Donax 'Variegata'</p>	<p>Feuillage persistant. Fleurs blanches en automne.</p>	<p>Peu rustique : de -2°C à -8°C. Croissance moyenne. Bonne terre de jardin, terre humide à très humide. Besoin en eau régulier du printemps à l'automne.</p>	
<p>19/ Prunus laurocerasus</p>	<p>Feuillage persistant. Fleurs blanches en mai.</p>	<p>Rustique : -15°C. Protéger des vents froids. Pousse entre 40 et 60 cm par</p>	

'Caucasica'		an. Sol pas trop sec à frais, pH neutre, non calcaire.	
20/ Choisya ternata	Feuillage persistant. Feuilles trifoliolées. Floraison blanche odorante en mai-juin et août-septembre.	Rustique : -15°C. Sol bien drainé et humifère, pH neutre.	